


## 6 Mocnost bodu ke kružnici

**Definice 18.** Mocností bodu  $M$  ke kružnici  $k(S; r)$  rozumíme reálné číslo  $m$ , pro které platí:

- (1)  $|MX| \cdot |MY| = |m|$ , kde  $X, Y$  jsou průsečíky kružnice  $k$  s její libovolnou sečnou procházející bodem  $M$ .
- (2) Je-li  $M$  vnějším bodem kružnice  $k$ , je  $m > 0$ .
- (3) Je-li  $M$  vnitřním bodem kružnice  $k$ , je  $m < 0$ .
- (4) Je-li  $M \in k$ , je  $m = 0$ .



Obrázek 24: Mocnost bodu  $M$  ke kružnici  $k$

**Věta 31.** Je dána kružnice  $k(S; r)$  a bod  $M$ , který na ní neleží. Potom pro libovolné dvě sečny kružnice  $k$ , které procházejí bodem  $M$ , jejichž průsečíky s kružnicí  $k$  označíme  $X_1, Y_1$  a  $X_2, Y_2$ , platí

$$|MX_1| \cdot |MY_1| = |MX_2| \cdot |MY_2|.$$

**Věta 32.** Nechť je dána kružnice  $k(S; r)$  a bod  $M$ . Potom pro mocnost  $m$  bodu  $M$  ke kružnici  $k$  platí

$$m = d^2 - r^2,$$

kde  $d = |MS|$  je vzdálenost bodu  $M$  od středu kružnice  $k$ .


**Věta 33.** Nechť  $M$  je vnější bod kružnice  $k(S; r)$ ,  $m$  jeho mocnost ke kružnici  $k$ . Jestliže  $T$  je dotykový bod tečny vedené z bodu  $M$  ke kružnici  $k$ , tak platí  $|MT|^2 = m$ .

## 6.1 Chordála a potenční střed

**Věta 34** (Chordála dvojice kružnic). *Nechť jsou  $k_1(S_1; r_1), k_2(S_2; r_2)$  dvě nesoustředné kružnice. Množina bodů  $X$ , které mají k oběma kružnicím stejnou mocnost, je přímka  $h \perp S_1S_2$ . Jestliže kružnice  $k_1, k_2$  mají společný bod  $M$ , potom přímka  $h$  prochází tímto bodem.*

**Poznámka.** Přímka  $h$ , která je množinou bodů  $X$ , majících stejnou mocnost k nesoustředným kružnicím  $k_1, k_2$  se nazývá **chordála** (též potenční přímka) kružnic  $k_1, k_2$ .

**Poznámka.** Bod, který má ke třem vzájemně různým kružnicím stejnou mocnost se nazývá **potenční bod** (též potenční střed).



Obrázek 25: Chordála  $h$  kružnic  $k_1, k_2$ , potenční bod  $P$  kružnic  $k_1, k_2, l$

### Analytické vyjádření chordály

Chordálu kružnic  $k_1(S_1[m_1, n_1], r_1), k_2(S_2[m_2, n_2], r_2)$  s rovnicemi  $k_1 : (x - m_1)^2 + (y - n_1)^2 = r_1^2$  a  $k_2 : (x - m_2)^2 + (y - n_2)^2 = r_2^2$  můžeme analyticky vyjádřit rovnicí:

$$(x - m_1)^2 + (y - n_1)^2 - r_1^2 = (x - m_2)^2 + (y - n_2)^2 - r_2^2 \quad (9)$$

**PŘÍKLAD 6.1.** *Sestrojte chordálu dvou nesoustředných kružnic  $k_1, k_2$ , které nemají společný bod.*

**PŘÍKLAD 6.2.** Určete analyticky množinu všech bodů roviny, které mají ke dvěma daným kružnicím stejnou mocnost.

**PŘÍKLAD 6.3.** Sestrojte kružnici  $k$ , která prochází danými body  $A \neq B$  a dotýká se dané přímky  $t$ .

## 6.2 Cvičení – Mocnost bodu ke kružnici

**57.** Je dán úhel  $\angle AVB$  a uvnitř něho bod  $M$ . Sestrojte kružnici, která prochází bodem  $M$  a dotýká se přímek  $AV, BV$ .

**58.** Obdélník má velikosti stran  $a, b$ . Máme sestrojit

a) libovolný obdélník stejného obsahu,

b) obdélník stejného obsahu, jehož jedna strana má danou velikost  $c$ .

**59.** Jsou dány dvě nesoustředné kružnice  $k_1, k_2$  a přímka  $p$ . Na této přímce určete bod  $P$  tak, aby tečny z něho vedené ke kružnicím  $k_1, k_2$  měly stejnou délku.

**60.** Sestrojte kružnici, která se dotýká dané kružnice  $k(S; r)$  a prochází dvěma různými body  $A, B$ , které leží vně dané kružnice  $k$ .

**61.** Je dán lichoběžník  $ABCD$  se základnami  $AB, CD$ ,  $|AB| > |CD|$ . Uvnitř úsečky  $AD$  sestrojte bod  $P$  a uvnitř úsečky  $BC$  bod  $Q$  tak, aby platilo zároveň  $PQ \parallel AB$  a  $PC \parallel AQ$ .

**62.** Sestrojte lichoběžník  $ABCD$ , jsou-li dány délky jeho ramen  $|BC| = 4.5\text{cm}$ ,  $|DA| = 3\text{cm}$  a velikost  $75^\circ$  úhlu, který svírají přímky  $BC$  a  $AD$ , platí-li navíc  $|AB \parallel CD| = |AC|^2$ .